

Anlage: An- und Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bei Betreuung von COVID-19 Patienten

Anziehen der PSA

	Schritt 1	alle Schmuckstücke und persönlichen Gegenstände entfernen Händedesinfektion mit einer alkoholischen Lösung (mind. 30 Sekunden) durchführen
	Schritt 2	ein erstes Paar Einmalhandschuhe anziehen
	Schritt 3	Schutzkittel oder Overall anziehen
	Schritt 4	Erforderliche FFP2 bzw. FFP3 Maske aufsetzen Sofort richtigen und dichten Sitz überprüfen Achtung Barträger
	Schritt 5	Schutzbrille / Visier aufsetzen
	Schritt 6	ein zweites Paar Einmalhandschuhe anziehen Handschuhe <i>über</i> den Ärmelbund des Kittels ziehen

Ausziehen der PSA

	Schritt 1	Schutzkittel oder Overall ausziehen An der Außenseite ergreifen-und über die Ärmel nach vorne ziehen. Körperfern abstreifen.
	Schritt 2	idealerweise wird das erste Paar Einmalhandschuhe gemeinsam mit dem Kittel ausgezogen
	Schritt 3	Schutzbrille / Visier ablegen.
	Schritt 4	FFP2 bzw. FFP3 Maske entfernen
	Schritt 5	das zweite Paar Einmalhandschuhe ausziehen
	Schritt 6	Händedesinfektion (mind. 30 Sekunden)